



SACHSEN-ANHALT

Landesverwaltungsamt



Herkunftsempfehlungen für forstliches Vermehrungsgut für das Land Sachsen-Anhalt

Impressum

**Landesverwaltungsamt
Referat Forst- und Jagdhoheit
Redaktionsschluss: 08.01.2014**

**Dienstgebäude:
Dessauer Str. 70
06118 Halle (Saale)**

**Hauptsitz:
Ernst-Kamieth-Str. 2
06112 Halle (Saale)**

**Tel.: 0345 514-0
Fax: 0345 514-1444
E-Mail: Poststelle@lvwa.sachsen-anhalt.de**

Internet: www.landesverwaltungsamt.sachsen-anhalt.de

Herkunftsempfehlungen für forstliches Vermehrungsgut für das Land Sachsen-Anhalt

1. Rechtliche Grundlagen und Verwaltungsvorschriften

- *Forstvermehrungsgutgesetz (FoVG) vom 22.05.2002; (BGBl. I Nr. 32, S. 1658)*
- *Forstvermehrungsgut-Zulassungsverordnung (FoVZV) (BGBl. I 2002, Nr. 88 v. 31.12.2002, S. 4721)*
- *Forstvermehrungsgut-Durchführungsverordnung (FoVDV) (BGBl. I 2002, Nr. 88 v. 31.12.2002, S. 4711)*
- *Verordnung der Herkunftsgebiete für forstliches Vermehrungsgut (Forstvermehrungsgut-Herkunftsgebietsverordnung, FoVHgV) v. 07.10.1994; BGBl. I S. 3578 geändert durch die Verordnung v. 15.01.2003 (BGBl. I S. 238)*
- *Verordnung zur Durchführung des Forstvermehrungsgutgesetzes (FoVG DVO) vom 21.12.2004 (GVBl. LSA Nr. 72/04, S. 879)*
- *Erlass des MLU zur Durchführung des FoVG vom 26.02.2004*

2. Allgemeines

Die Erbanlagen des Ausgangsmaterials für forstliches Vermehrungsgut (i.d.R. Bestände) bestimmen ganz wesentlich den waldbaulichen und finanziellen Erfolg, und das möglicherweise über Generationen von Beständen hinweg. Dies gilt sowohl für die natürliche als auch für die künstliche Verjüngung. Die Empfehlungen für die Verwendung forstlichen Vermehrungsgutes in Sachsen-Anhalt beruhen auf langjährigen Versuchen und Anbauerfahrungen in der Praxis, sowie Rückschlüssen von positiven Phänotypen auf erbliche Ursachen im Analogievergleich zu anderen Baumarten.

3. Grundsätze

Mit den Herkunftsempfehlungen für forstliches Vermehrungsgut in Sachsen-Anhalt erhalten die Waldbesitzer und Forstbetriebe/Zusammenschlüsse die für die Herkunftswahl notwendigen Grundlagen. Gleichzeitig sollen mit den Empfehlungen die Forstsaamen- und Forstpflanzenbetriebe in der Lage versetzt werden, sich mittelfristig auf eine herkunftsgerichtete Nachfrage einzustellen.

Für Verjüngungsmaßnahmen ist Vermehrungsgut aus dem Herkunftsgebiet zu verwenden, in dem sich die Verjüngungsfläche befindet. Ist dieses Vermehrungsgut für eine geplante Verjüngung nicht verfügbar, werden entsprechende Austauschherkünfte empfohlen.

Die Herkunftsempfehlungen sind für den Landeswald und bei waldbaulichen Maßnahmen, für die Fördermittel ausgereicht werden, verbindlich. Darüber hinaus dient die Herkunftsempfehlung für Waldbesitzer als Orientierungsgrundlage.



Abb.: Robinien-Samenplantage „Göritz“ Qualifiziertes Vermehrungsgut EZR-Nr.:15 3 81902 001 3


Baumarten, die der Richtlinie 1999/105/EG unterliegen und Bestandteil der Herkunftsempfehlungen in Sachsen-Anhalt sind:

| | | | |
|---|-----|--------------------|----------|
| <i>Abies alba Mill.</i> | 827 | Weißtanne | Blatt 1 |
| <i>Abies grandis Lindl.</i> | 830 | Große Küstentanne | Blatt 2 |
| <i>Acer platanoides L.</i> | 800 | Spitzahorn | Blatt 3 |
| <i>Acer pseudoplatanus L.</i> | 801 | Bergahorn | Blatt 4 |
| <i>Alnus glutinosa (L.) Gaertn.</i> | 802 | Roterle | Blatt 5 |
| <i>Alnus incana (L.) Moench</i> | 803 | Grauerle | Blatt 6 |
| <i>Betula pendula Roth</i> | 804 | Sandbirke | Blatt 7 |
| <i>Betula pubescens Ehrh.</i> | 805 | Moorbirke | Blatt 8 |
| <i>Carpinus betulus L.</i> | 806 | Hainbuche | Blatt 9 |
| <i>Castanea sativa Mill.</i> | 808 | Esskastanie | Blatt 10 |
| <i>Fagus sylvatica L.</i> | 810 | Rotbuche | Blatt 11 |
| <i>Fraxinus excelsior L.</i> | 811 | Esche | Blatt 12 |
| <i>Larix decidua Mill.</i> | 837 | Europäische Lärche | Blatt 13 |
| <i>Larix kaempferi (Lamb.) Carr.</i> | 839 | Japanische Lärche | Blatt 14 |
| <i>Picea abies (L.) Karst.</i> | 840 | Fichte | Blatt 15 |
| <i>Picea sitchensis (Bong.) Carr.</i> | 844 | Sitkafichte | Blatt 16 |
| <i>Pinus nigra Arnold</i> | 847 | Schwarzkiefer | Blatt 17 |
| <i>Pinus sylvestris L.</i> | 851 | Kiefer | Blatt 18 |
| <i>Populus spp.</i> | 900 | Pappel | Blatt 19 |
| <i>Prunus avium L.</i> | 814 | Vogelkirsche | Blatt 20 |
| <i>Pseudotsuga menziesii (Mirb.) Franco</i> | 853 | Douglasie | Blatt 21 |
| <i>Quercus petraea (Mattuschka) Liebl.</i> | 818 | Traubeneiche | Blatt 22 |
| <i>Quercus robur L.</i> | 817 | Stieleiche | Blatt 23 |
| <i>Quercus rubra L.</i> | 816 | Roteiche | Blatt 24 |
| <i>Robinia pseudoacacia L.</i> | 819 | Robinie | Blatt 25 |
| <i>Tilia cordata Mill.</i> | 823 | Winterlinde | Blatt 26 |
| <i>Tilia platyphyllos Scop.</i> | 824 | Sommerlinde | Blatt 27 |

Blatt 1

| Baumart: Weißtanne (<i>Abies alba</i> Mill.) 827 | |
|---|---|
| Herkunftsgebiet <i>Wuchsgebiet</i> | mögliche Austauschherkünfte <i>mögliche DKV-Austauschherkünfte</i> |
| 82702 Nordostdeutsches Tiefland und Niedersächsisches Binnenland <i>13 Ostniedersächsisch-Altmarkisches Altmoränenland</i> | 82703 und 82704 |
| 82703 Mittel- und Ostdeutsches Tief- und Hügelland außer Niederlausitz <i>11 Mittelbrandenburger Talsand- u. Moränenland</i> <i>14 Mittleres Nordostdeutsches Altmoränenland</i> <i>15 Düben-Niederlausitzer Altmoränenland</i> <i>16 Hoher Fläming</i> <i>21 Nordwestliches Harzvorland</i> <i>22 Nordöstliche Harzvorländer</i> <i>23 Sachsen-Anhaltinische Löß-Ebene</i> <i>24 Leipziger Sandlöß-Ebene</i> <i>25 Sächsisch-Thüringisches Löß-Hügelland</i> <i>29 Inneres Thüringer Becken</i> <i>30 Nördliche Randplatten des Thüringer Becken</i> <i>31 Südliche Randplatten des Thüringer Becken</i> <i>41 Kyffhäuser</i> | 82702 |
| 82705 Westdeutsches Bergland und Oberrheingraben <i>30 tlw. Nördliche Randplatten des Thüringer Becken</i> <i>40 Harz</i> | 82706 |


Herkunftsgebiete der *Abies alba* Mill. Weißtanne [827] in Sachsen-Anhalt



Blatt 2

| Baumart: | Große Küstentanne (<i>Abies grandis</i> Lindl.) 830 | |
|---|--|--|
| Herkunftsgebiet <i>Wuchsgebiet</i> | mögliche Austauschherkünfte <i>mögliche DKV-Austauschherkünfte</i> | |
| 83001 Norddeutsches Tiefland <i>13 Ostniedersächsisch-Altmarkisches Altmoränenland</i> | keine | |
| 83002 Übriges Bundesgebiet <i>11 Mittelbrandenburger Talsand- u. Moränenland 14 Mittleres Nordostdeutsches Altmoränenland 15 Düben-Niederlausitzer Altmoränenland 16 Hoher Fläming 21 Nordwestliches Harzvorland 22 Nordöstliche Harzvorländer 23 Sachsen-Anhaltinische Löß-Ebene 24 Leipziger Sandlöß-Ebene 25 Sächsisch-Thüringisches Löß-Hügelland 29 Inneres Thüringer Becken 30 Nördliche Randplatten des Thüringer Becken 31 Südliche Randplatten des Thüringer Becken 40 Harz 41 Kyffhäuser</i> | 83001 aus ökologischer Grundeinheit 5 (= WG 13 sowie Göhrde, Wendland und Prignitz) | |


Herkunftsgebiete der *Abies grandis* Lindl. Große Küstentanne [830] in Sachsen-Anhalt



Blatt 3

| Baumart: Spitzhorn (<i>Acer platanoides</i> L.) 800 | |
|---|--|
| Herkunftsgebiet | mögliche Austauschherkünfte |
| <i>Wuchsgebiet</i> | <i>mögliche DKV-Austauschherkünfte</i> |
| 80001 Norddeutsches Tiefland <i>13 Ostniedersächsisch-Altmärkisches Altmoränenland</i> | 80002 |
| 80002 Mittel- und Ostdeutsches Tief- und Hügelland <i>11 Mittelbrandenburger Talsand- u. Moränenland</i> <i>14 Mittleres Nordostdeutsches Altmoränenland</i> <i>15 Düben-Niederlausitzer Altmoränenland</i> <i>16 Hoher Fläming</i> <i>21 Nordwestliches Harzvorland</i> <i>22 Nordöstliche Harzvorländer</i> <i>23 Sachsen-Anhaltinische Löß-Ebene</i> <i>24 Leipziger Sandlöß-Ebene</i> <i>25 Sächsisch-Thüringisches Löß-Hügelland</i> <i>29 Inneres Thüringer Becken</i> <i>30 Nördliche Randplatten des Thüringer Becken</i> <i>31 Südliche Randplatten des Thüringer Becken</i> <i>41 Kyffhäuser</i> | keine |
| 80004 West- und Süddeutsches Bergland sowie Alpen und Alpenvorland <i>30 tlw. Nördliche Randplatten des Thüringer Becken</i> <i>40 Harz</i> | keine |


Herkunftsgebiete des *Acer platanoides* L. Spitzahorn [800] in Sachsen-Anhalt



Blatt 4

| Baumart: | Bergahorn (<i>Acer pseudoplatanus</i> L.) 801 | |
|---|--|--|
| Herkunftsgebiet <i>Wuchsgebiet</i> | mögliche Austauschherkünfte <i>mögliche DKV-Austauschherkünfte</i> | |
| 80101 Norddeutsches Tiefland <i>13 Ostniedersächsisch-Altmarkisches Altmoränenland</i> | „Geprüftes Vermehrungsgut“ Samenplantage "Günthersberge" EZR-Nr.: 15 3 80102 001 4 und DKV-Sonderherkunft "Ostharz" EZR-Nr.: 15 5 80103 002 2 | |
| 80102 Mittel- und Ostdeutsches Tief- und Hügelland <i>11 Mittelbrandenburger Talsand- u. Moränenland</i> <i>14 Mittleres Nordostdeutsches Altmoränenland</i> <i>15 Düben-Niederlausitzer Altmoränenland</i> <i>16 Hoher Fläming</i> <i>21 Nordwestliches Harzvorland</i> <i>22 Nordöstliche Harzvorländer</i> <i>23 Sachsen-Anhaltinische Löß-Ebene</i> <i>24 Leipziger Sandlöß-Ebene</i> <i>25 Sächsisch-Thüringisches Löß-Hügelland</i> <i>29 Inneres Thüringer Becken</i> <i>30 Nördliche Randplatten des Thüringer Becken</i> <i>31 Südliche Randplatten des Thüringer Becken</i> <i>41 Kyffhäuser</i> | DKV-Sonderherkunft "Ostharz" EZR-Nr.: 15 5 80103 002 2 | |
| 80103 Westdeutsches Bergland bis 400 m, kolline Stufe <i>30 tlw. Nördliche Randplatten des Thüringer Becken</i> <i>40 Harz</i> | „Geprüftes Vermehrungsgut“ Samenplantage „Günthersberge“ EZR-Nr.: 15 3 80102 001 4 | |
| 80104 Westdeutsches Bergland > 400 m, montane Stufe <i>40 Harz</i> | Geprüftes Vermehrungsgut“ Samenplantage "Günthersberge" EZR-Nr.: 15 3 80102 001 4 | |


Herkunftsgebiete des *Acer pseudoplatanus* L. Bergahorn [801] in Sachsen-Anhalt



Blatt 5

| Baumart: Roterle (<i>Alnus glutinosa</i> L. Gaertn.) 802 | |
|---|--|
| Herkunftsgebiet <i>Wuchsgebiet</i> | mögliche Austauschherkünfte <i>mögliche DKV-Austauschherkünfte</i> |
| 80202 Nordostdeutsches Tiefland <i>13 Ostniedersächsisch-Altmarkisches Altmoränenland</i> | 80203 |
| 80203 Mittel- und Ostdeutsches Tief- und Hügelland <i>11 Mittelbrandenburger Talsand- u. Moränenland</i> <i>14 Mittleres Nordostdeutsches Altmoränenland</i> <i>15 Düben-Niederlausitzer Altmoränenland</i> <i>16 Hoher Fläming</i> <i>21 Nordwestliches Harzvorland</i> <i>22 Nordöstliche Harzvorländer</i> <i>23 Sachsen-Anhaltinische Löß-Ebene</i> <i>24 Leipziger Sandlöß-Ebene</i> <i>25 Sächsisch-Thüringisches Löß-Hügelland</i> <i>29 Inneres Thüringer Becken</i> <i>30 Nördliche Randplatten des Thüringer Becken</i> <i>31 Südliche Randplatten des Thüringer Becken</i> <i>41 Kyffhäuser</i> | „Qualifiziertes Vermehrungsgut“ Samenplantage „Uetze-Wienhausen“, Reinhausen, Nds EZR-Nr.: 03 4 80201 001 3 und „Qualifiziertes Vermehrungsgut“ Samenplantage "Danndorf", Oldendorf, Nds EZR-Nr.: 03 4 80202 001 3 |
| 80204 Westdeutsches Bergland <i>30 tlw. Nördliche Randplatten des Thüringer Becken</i> <i>40 Harz</i> | keine |

Herkunftsgebiete der *Alnus glutinosa* (L.) Gaertn. Schwarzerle [802] in Sachsen-Anhalt



Blatt 6

| Baumart: | | Grauerle (<i>Alnus incana</i> L. Moench) 803 |
|---------------------------------------|---|--|
| Herkunftsgebiet | Wuchsgebiet | mögliche Austauschherkünfte mögliche DKV-Austauschherkünfte |
| 80301 Bundesgebiet nördlich der Donau | <ul style="list-style-type: none"> 11 Mittelbrandenburger Talsand- u. Moränenland 13 Ostniedersächsisch-Altmarkisches Altmoränenland 14 Mittleres Nordostdeutsches Altmoränenland 15 Düben-Niederlausitzer Altmoränenland 16 Hoher Fläming 21 Nordwestliches Harzvorland 22 Nordöstliche Harzvorländer 23 Sachsen-Anhaltinische Löß-Ebene 24 Leipziger Sandlöß-Ebene 25 Sächsisch-Thüringisches Löß-Hügelland 29 Inneres Thüringer Becken 30 Nördliche Randplatten des Thüringer Becken 31 Südliche Randplatten des Thüringer Becken 40 Harz 41 Kyffhäuser | keine |

Herkunftsgebiete der *Alnus incana* (L.) Moench Grauerle [803] in Sachsen-Anhalt




Blatt 7

| Baumart: Sandbirke (<i>Betula pendula</i> Roth) 804 | |
|---|--|
| Herkunftsgebiet <i>Wuchsgebiet</i> | mögliche Austauschherkünfte <i>mögliche DKV-Austauschherkünfte</i> |
| 80401 Norddeutsches Tiefland <i>13 Ostniedersächsisch-Altmarkisches Altmoränenland</i> | 804 02 (insbesondere „Qualifiziertes Vermehrungsgut“ Samenplantage „Waldsiefersdorf“ EZR-Nr.:12 3 80402 001 3 und <i>DKV-Sonderherkunft "Dübener Heide"</i> EZR-Nr.: 15 3 80402 004 2) |
| 80402 Mittel- und Ostdeutsches Tief- und Hügelland <i>11 Mittelbrandenburger Talsand- u. Moränenland</i> <i>14 Mittleres Nordostdeutsches Altmoränenland</i> <i>15 Dübener-Niederlausitzer Altmoränenland</i> <i>16 Hoher Fläming</i> <i>21 Nordwestliches Harzvorland</i> <i>22 Nordöstliche Harzvorländer</i> <i>23 Sachsen-Anhaltinische Löß-Ebene</i> <i>24 Leipziger Sandlöß-Ebene</i> <i>25 Sächsisch-Thüringisches Löß-Hügelland</i> <i>29 Inneres Thüringer Becken</i> <i>30 Nördliche Randplatten des Thüringer Becken</i> <i>31 Südliche Randplatten des Thüringer Becken</i> <i>41 Kyffhäuser</i> | keine |
| 80404 West- und Süddeutsches Bergland sowie Alpen und Alpenvorland <i>30 tlw. Nördliche Randplatten des Thüringer Becken</i> <i>40 Harz</i> | keine |

Herkunftsgebiete der *Betula pendula* Roth Sandbirke [804]


in Sachsen-Anhalt



Blatt 8

| Baumart: Moorbirke (<i>Betula pubescens</i> Ehrh.) 805 | |
|---|--|
| Herkunftsgebiet | mögliche Austauschherkünfte |
| <i>Wuchsgebiet</i> | <i>mögliche DKV-Austauschherkünfte</i> |
| 80501 Norddeutsches Tiefland <i>13 Ostniedersächsisch-Altmärkisches Altmoränenland</i> | 80502 |
| 80502 Mittel- und Ostdeutsches Tief- und Hügelland <i>11 Mittelbrandenburger Talsand- u. Moränenland</i> <i>14 Mittleres Nordostdeutsches Altmoränenland</i> <i>15 Düben-Niederlausitzer Altmoränenland</i> <i>16 Hoher Fläming</i> <i>21 Nordwestliches Harzvorland</i> <i>22 Nordöstliche Harzvorländer</i> <i>23 Sachsen-Anhaltinische Löß-Ebene</i> <i>24 Leipziger Sandlöß-Ebene</i> <i>25 Sächsisch-Thüringisches Löß-Hügelland</i> <i>29 Inneres Thüringer Becken</i> <i>30 Nördliche Randplatten des Thüringer Becken</i> <i>31 Südliche Randplatten des Thüringer Becken</i> <i>41 Kyffhäuser</i> | keine |
| 80504 West- und Süddeutsches Bergland sowie Alpen und Alpenvorland <i>30 tlw. Nördliche Randplatten des Thüringer Becken</i> <i>40 Harz</i> | keine |


Herkunftsgebiete der *Betula pubescens* Ehrh. Moorbirke [805] in Sachsen-Anhalt



Blatt 9

| Baumart: | | Hainbuche (<i>Carpinus betulus</i> L.) 806 | |
|--|--|---|--|
| Herkunftsgebiet | | mögliche Austauschherkünfte | |
| Wuchsgebiet | | mögliche DKV-Austauschherkünfte | |
| 80601 Norddeutsches Tiefland | 13 Ostniedersächsisch-Altmarkisches Altmoränenland | DKV-Sonderherkunft "Ostharz" EZR-Nr.: 15 4 80604 001 2 DKV-Sonderherkunft "Ziegelrodaer Plateau" EZR-Nr.: 15 4 80602 002 2 DKV-Sonderherkunft "Saale-Unstrut" EZR-Nr.: 15 4 80602 003 2 und 15 4 80602 005 2 | |
| 80602 Mittel- und Ostdeutsches Tief- und Hügelland | 11 Mittelbrandenburger Talsand- u. Moränenland 14 Mittleres Nordostdeutsches Altmoränenland 15 Düben-Niederlausitzer Altmoränenland 16 Hoher Fläming 21 Nordwestliches Harzvorland 22 Nordöstliche Harzvorländer 23 Sachsen-Anhaltinische Löß-Ebene 24 Leipziger Sandlöß-Ebene 25 Sächsisch-Thüringisches Löß-Hügelland 29 Inneres Thüringer Becken 30 Nördliche Randplatten des Thüringer Becken 31 Südliche Randplatten des Thüringer Becken 41 Kyffhäuser | DKV-Sonderherkunft "Ostharz" EZR-Nr.: 15 4 80604 001 2 | |
| 80604 West- und Süddeutsches Bergland sowie Alpen und Alpenvorland | 30 tlw. Nördliche Randplatten des Thüringer Becken 40 Harz (<u>nur</u> für WB 4004, 4005, 4006 und 4007) | DKV-Sonderherkunft "Saale-Unstrut" EZR-Nr.: 15 4 80602 003 2 und 15 4 80602 005 2 DKV-Sonderherkunft "Ziegelrodaer Plateau" EZR-Nr.: 15 4 80602 002 2 | |


Herkunftsgebiete der *Carpinus betulus* L. Hainbuche [806] in Sachsen-Anhalt



Blatt 10

| Baumart: Esskastanie (<i>Castanea sativa</i> Mill.) 808 | |
|---|--|
| Herkunftsgebiet | mögliche Austauschherkünfte |
| <i>Wuchsgebiet</i> | <i>mögliche DKV-Austauschherkünfte</i> |
| 80801 Norddeutsches Tiefland <i>13 Ostniedersächsisch-Altmärkisches Altmoränenland</i> | 80802 |
| 80802 Übriges Bundesgebiet <i>11 Mittelbrandenburger Talsand- u. Moränenland</i> <i>14 Mittleres Nordostdeutsches Altmoränenland</i> <i>15 Düben-Niederlausitzer Altmoränenland</i> <i>16 Hoher Fläming</i> <i>21 Nordwestliches Harzvorland</i> <i>22 Nordöstliche Harzvorländer</i> <i>23 Sachsen-Anhaltinische Löß-Ebene</i> <i>24 Leipziger Sandlöß-Ebene</i> <i>25 Sächsisch-Thüringisches Löß-Hügelland</i> <i>29 Inneres Thüringer Becken</i> <i>30 Nördliche Randplatten des Thüringer Becken</i> <i>31 Südliche Randplatten des Thüringer Becken</i> <i>40 Harz</i> <i>41 Kyffhäuser</i> | 80801 aus ökologischer Grundeinheit 5 (= WG 13 sowie Göhrde, Wendland und Prignitz) |

Herkunftsgebiete der *Castanea sativa* Mill. Esskastanie [808] in Sachsen-Anhalt




Blatt 11

| Baumart: Rotbuche (<i>Fagus sylvatica</i> L.) 810 | |
|---|---|
| Herkunftsgebiet <i>Wuchsgebiet</i> | mögliche Austauschherkünfte <i>mögliche DKV-Austauschherkünfte</i> |
| 81003 Heide und Altmark <i>13 Ostniedersächsisch-Altmärkisches Altmoränenland</i> | 81004 und 81005 |
| 81005 Märkisch-Lausitzer Tiefland <i>11 Mittelbrandenburger Talsand- u. Moränenland</i> <i>11 Mittelbrandenburger Talsand- u. Moränenland</i> <i>14 Mittleres Nordostdeutsches Altmoränenland</i> <i>15 Düben-Niederlausitzer Altmoränenland</i> <i>16 Hoher Fläming</i> | 81003 aus ökologischer Grundeinheit 5 (= WG 13 sowie Göhrde, Wendland und Prignitz) 81004 |
| 81006 Mitteldeutsches Tief- und Hügelland <i>21 Nordwestliches Harzvorland</i> <i>22 Nordöstliche Harzvorländer</i> <i>23 Sachsen-Anhaltinische Löß-Ebene</i> <i>24 Leipziger Sandlöß-Ebene</i> <i>25 Sächsisch-Thüringisches Löß-Hügelland</i> <i>29 Inneres Thüringer Becken</i> <i>30 Nördliche Randplatten des Thüringer Becken</i> <i>31 Südliche Randplatten des Thüringer Becken</i> <i>41 Kyffhäuser</i> | 81009 und 81010 aus ökologischer Grundeinheit 8 (= WG 40 sowie Westharz) |
| 81009 Harz, Weser- und Hessisches Bergland bis 400 m, kolline Stufe <i>30 tlw. Nördliche Randplatten des Thüringer Becken</i> <i>40 Harz</i> | 81010 und 81011 |
| 81010 Harz, Weser- und Hessisches Bergland > 400 m, montane Stufe <i>40 Harz</i> | 81012 |

Herkunftsgebiete der *Fagus sylvatica* L. Rotbuche [810]


in Sachsen-Anhalt



Blatt 12

| Baumart: | | Esche (<i>Fraxinus excelsior</i> L.) 811 |
|--|---|--|
| Herkunftsgebiet | Wuchsgebiet | mögliche Austauschherkünfte mögliche DKV-Austauschherkünfte |
| 81102 Nordostdeutsches Tiefland | 13 <i>Ostniedersächsisch-Altmarkisches Altmoränenland</i> | 81103 (<i>insbesondere DKV-Sonderherkunft "Saale-Elster-Aue" EZR-Nr.: 15 4 81103 004 2 und DKV-Sonderherkunft "Mittlere Elbe" EZR-Nr.: 15 3 81103 029 2</i>) |
| 81103 Mittel- und Ostdeutsches Tief- und Hügelland | 11 <i>Mittelbrandenburger Talsand- u. Moränenland</i> 14 <i>Mittleres Nordostdeutsches Altmoränenland</i> 15 <i>Düben-Niederlausitzer Altmoränenland</i> 16 <i>Hoher Fläming</i> 21 <i>Nordwestliches Harzvorland</i> 22 <i>Nordöstliche Harzvorländer</i> 23 <i>Sachsen-Anhaltinische Löß-Ebene</i> 24 <i>Leipziger Sandlöß-Ebene</i> 25 <i>Sächsisch-Thüringisches Löß-Hügelland</i> 29 <i>Inneres Thüringer Becken</i> 30 <i>Nördliche Randplatten des Thüringer Becken</i> 31 <i>Südliche Randplatten des Thüringer Becken</i> 41 <i>Kyffhäuser</i> | 81102 (<u>nur</u> aus WG 13) |
| 81104 Westdeutsches Bergland | 30 <i>tlw. Nördliche Randplatten des Thüringer Becken</i> 40 <i>Harz</i> | keine |


Herkunftsgebiete der *Fraxinus excelsior* L. Gemeinde Esche [811] in Sachsen-Anhalt



Blatt 13

| Baumart: | | Europäische Lärche (<i>Larix decidua</i> Mill.) 837 |
|--|---|---|
| Herkunftsgebiet | Wuchsgebiet | mögliche Austauschherkünfte mögliche DKV-Austauschherkünfte |
| 83701 Norddeutsches Tiefland | 13 <i>Ostniedersächsisch-Altmarkisches Altmoränenland</i> | "Geprüftes Vermehrungsgut" Samenplantage "Nedlitz" EZR-Nr.: 15 3 83702 001 4 und DKV-Sonderherkunft "Harbke" EZR-Nr.: 15 5 83702 065 2 und 15 5 83702 056 2 |
| 83702 Mittel- und Ostdeutsches Tief- und Hügelland | 11 <i>Mittelbrandenburger Talsand- u. Moränenland</i> 14 <i>Mittleres Nordostdeutsches Altmoränenland</i> 15 <i>Düben-Niederlausitzer Altmoränenland</i> 16 <i>Hoher Fläming</i> 21 <i>Nordwestliches Harzvorland</i> 22 <i>Nordöstliche Harzvorländer</i> 23 <i>Sachsen-Anhaltinische Löß-Ebene</i> 24 <i>Leipziger Sandlöß-Ebene</i> 25 <i>Sächsisch-Thüringisches Löß-Hügelland</i> 29 <i>Inneres Thüringer Becken</i> 30 <i>Nördliche Randplatten des Thüringer Becken</i> 31 <i>Südliche Randplatten des Thüringer Becken</i> 41 <i>Kyffhäuser</i> | DKV-Sonderherkunft "Wismarer Lärche" "Geprüftes Vermehrungsgut" Erntebestand EZR-Nr. 15 1 83701 001 4 „Ausgewähltes Vermehrungsgut“ EZR-Nr.: 15 1 83701 005 2 15 1 83701 006 2 15 1 83701 007 2 15 1 83701 008 2 15 1 83701 011 2 |
| 83703 West- und Süddeutsches Hügel- und Bergland | 30 <i>tlw. Nördliche Randplatten des Thüringer Becken</i> 40 <i>Harz</i> | Keine |

Herkunftsgebiete der *Larix decidua* Mill. Europäische Lärche [837] in Sachsen-Anhalt




Blatt 14

| Baumart: | | Japanische Lärche [<i>Larix kaempferi</i> (Lamb.) Carr.] 839 | |
|--------------------|---|---|--|
| Herkunftsgebiet | | mögliche Austauschherkünfte | |
| <i>Wuchsgebiet</i> | | <i>mögliche DKV-Austauschherkünfte</i> | |
| 83901 | Norddeutsches Tiefland <i>13 Ostniedersächsisch-Altmärkisches Altmoränenland</i> | keine | |
| 83902 | Übriges Bundesgebiet <i>11 Mittelbrandenburger Talsand- u. Moränenland</i> <i>14 Mittleres Nordostdeutsches Altmoränenland</i> <i>15 Düben-Niederlausitzer Altmoränenland</i> <i>16 Hoher Fläming</i> <i>21 Nordwestliches Harzvorland</i> <i>22 Nordöstliche Harzvorländer</i> <i>23 Sachsen-Anhaltinische Löß-Ebene</i> <i>24 Leipziger Sandlöß-Ebene</i> <i>25 Sächsisch-Thüringisches Löß-Hügelland</i> <i>29 Inneres Thüringer Becken</i> <i>30 Nördliche Randplatten des Thüringer Becken</i> <i>31 Südliche Randplatten des Thüringer Becken</i> <i>40 Harz</i> <i>41 Kyffhäuser</i> | keine | |

Herkunftsgebiete der *Larix kaempferi* (Lamb.) Carr.

Japanische Lärche [839]


in Sachsen-Anhalt



Blatt 15

| Baumart: | | Fichte [<i>Picea abies</i> (L.) Karst.] 840 | |
|--------------------|--|--|--|
| Herkunftsgebiet | | mögliche Austauschherkünfte | |
| <i>Wuchsgebiet</i> | | <i>mögliche DKV-Austauschherkünfte</i> | |
| 84001 | Norddeutsches Tiefland <i>13 Ostniedersächsisch-Altmärkisches Altmoränenland</i> | 84002 und 84003 | |
| 84002 | Mittel- und Ostdeutsches Tiefland außer Niederlausitz <i>11 Mittelbrandenburger Talsand- u. Moränenland</i> <i>14 Mittleres Nordostdeutsches Altmoränenland</i> <i>15 Düben-Niederlausitzer Altmoränenland</i> <i>16 Hoher Fläming</i> <i>21 Nordwestliches Harzvorland</i> <i>22 Nordöstliche Harzvorländer</i> <i>23 Sachsen-Anhaltinische Löß-Ebene</i> <i>24 Leipziger Sandlöß-Ebene</i> <i>25 Sächsisch-Thüringisches Löß-Hügelland</i> <i>29 Inneres Thüringer Becken</i> <i>30 Nördliche Randplatten des Thüringer Becken</i> <i>31 Südliche Randplatten des Thüringer Becken</i> <i>41 Kyffhäuser</i> | 84003 | |
| 84008 | Harz, kolline Stufe (bis 400 m) <i>30 tlw. Nördliche Randplatten des Thüringer Becken</i> <i>40 Harz</i> | 84009, 84011 und 84014 | |
| 84009 | Harz, montane Stufe (400 - 700 m) <i>40 Harz</i> | 84010, 84012 und 84015 | |
| 84010 | Harz, hochmontane Stufe (> 700 m) <i>40 Harz</i> | 84016 | |

Herkunftsgebiete der *Picea abies* (L.) Karst. Gemeine Fichte [840] in Sachsen-Anhalt




Blatt 16

| Baumart: | | Sitkafichte [<i>Picea sitchensis</i> (Bong.) Carr.] 844 |
|------------------------------|---|--|
| Herkunftsgebiet | Wuchsgebiet | mögliche Austauschherkünfte mögliche DKV-Austauschherkünfte |
| 84401 Norddeutsches Tiefland | 13 Ostniedersächsisch-Altmärkisches Altmoränenland | keine |
| 84402 Übriges Bundesgebiet | 11 Mittelbrandenburger Talsand- u. Moränenland 14 Mittleres Nordostdeutsches Altmoränenland 15 Düben-Niederlausitzer Altmoränenland 16 Hoher Fläming 21 Nordwestliches Harzvorland 22 Nordöstliche Harzvorländer 23 Sachsen-Anhaltinische Löß-Ebene 24 Leipziger Sandlöß-Ebene 25 Sächsisch-Thüringisches Löß-Hügelland 29 Inneres Thüringer Becken 30 Nördliche Randplatten des Thüringer Becken 31 Südliche Randplatten des Thüringer Becken 40 Harz 41 Kyffhäuser | keine (Anbau in Sachsen-Anhalt nicht zu empfehlen) |

Herkunftsgebiete der *Picea sitchensis* (Bong.) Carr.

Sitka-Fichte [844]


in Sachsen-Anhalt



Blatt 17

| Baumart: | Schwarzkiefer (Pinus nigra Arnold) varietas austriaca 847 varietas calabrica 848 varietas corsicana 849 | |
|--|---|---|
| Herkunftsgebiet | <i>Wuchsgebiet</i> | mögliche Austauschherkünfte <i>mögliche DKV-Austauschherkünfte</i> |
| 84701 Norddeutsches Tiefland 84801 84901 | 13 <i>Ostniedersächsisch-Altmarkisches Altmoränenland</i> | keine |
| 84702 Übriges Bundesgebiet 84802 84902 | 11 <i>Mittelbrandenburger Talsand- u. Moränenland</i> 14 <i>Mittleres Nordostdeutsches Altmoränenland</i> 15 <i>Düben-Niederlausitzer Altmoränenland</i> 16 <i>Hoher Fläming</i> 21 <i>Nordwestliches Harzvorland</i> 22 <i>Nordöstliche Harzvorländer</i> 23 <i>Sachsen-Anhaltinische Löß-Ebene</i> 24 <i>Leipziger Sandlöß-Ebene</i> 25 <i>Sächsisch-Thüringisches Löß-Hügelland</i> 29 <i>Inneres Thüringer Becken</i> 30 <i>Nördliche Randplatten des Thüringer Becken</i> 31 <i>Südliche Randplatten des Thüringer Becken</i> 40 <i>Harz</i> 41 <i>Kyffhäuser</i> | keine |


Herkunftsgebiete der *Pinus nigra* Arnold Schwarzkiefer [847] in Sachsen-Anhalt



Blatt 18

| Baumart: Kiefer (<i>Pinus sylvestris</i> L.) 851 | |
|--|--|
| Herkunftsgebiet | mögliche Austauschherkünfte |
| <i>Wuchsgebiet</i> | <i>mögliche DKV-Austauschherkünfte</i> |
| 85103 Heide und Altmark <i>13 Ostniedersächsisch-Altmärkisches Altmoränenland</i> | 85104 (insbesondere „Geprüftes Vermehrungsgut“ und „Qualifiziertes Vermehrungsgut“ der Samenplantagen aus HKG 85104) |
| 85104 Mittel- und Ostdeutsches Tiefland <i>11 Mittelbrandenburger Talsand- u. Moränenland</i> <i>14 Mittleres Nordostdeutsches Altmoränenland</i> <i>15 Düben-Niederlausitzer Altmoränenland</i> <i>16 Hoher Fläming</i> <i>21 Nordwestliches Harzvorland</i> <i>22 Nordöstliche Harzvorländer</i> <i>23 Sachsen-Anhaltinische Löß-Ebene</i> <i>24 Leipziger Sandlöß-Ebene</i> <i>29 Inneres Thüringer Becken</i> <i>30 Nördliche Randplatten des Thüringer Becken</i> <i>41 Kyffhäuser</i> | "Geprüftes Vermehrungsgut" Samenplantage "Wenze" EZR-Nr.: 151 85103 001 4 |
| 85105 Westdeutsches Bergland kolline Stufe, bis 400 m <i>30 tlw. Nördliche Randplatten des Thüringer Becken</i> <i>40 Harz</i> | 85107 und 85109 |
| 85106 Westdeutsches Bergland montane Stufe > 400 m <i>40 Harz</i> | keine |
| 85109 Thüringisch-Sächsisches Hügelland <i>23 tlw. Sachsen-Anhaltinische Löß-Ebene</i> <i>25 Sächsisch-Thüringisches Löß-Hügelland</i> <i>31 Südliche Randplatten des Thüringer Becken</i> | 85105 |

Herkunftsgebiete der *Pinus sylvestris* L. Gemeine Kiefer [851] in Sachsen-Anhalt



Blatt 19

| Baumart: | Pappel (Populus spp.) 900 | |
|---|---|---------------------------------|
| Herkunftsgebiet | mögliche Austauschherkünfte | mögliche DKV-Austauschherkünfte |
| <p>90001 Bundesgebiet</p> <ul style="list-style-type: none"> 11 Mittelbrandenburger Talsand- u. Moränenland 13 Ostniedersächsisch-Altmarkisches Altmoränenland 14 Mittleres Nordostdeutsches Altmoränenland 15 Düben-Niederlausitzer Altmoränenland 16 Hoher Fläming 21 Nordwestliches Harzvorland 22 Nordöstliche Harzvorländer 23 Sachsen-Anhaltinische Löß-Ebene 24 Leipziger Sandlöß-Ebene 25 Sächsisch-Thüringisches Löß-Hügelland 29 Inneres Thüringer Becken 30 Nördliche Randplatten des Thüringer Becken 31 Südliche Randplatten des Thüringer Becken 40 Harz 41 Kyffhäuser | <p>keine</p> <p>Schwarzpappel</p> <p>Aufgrund bestehender genetischer Unterschiede zwischen den Vorkommen in den einzelnen Flussgebietssystemen Deutschlands können Adaptionprobleme auftreten.</p> <p>Als Empfehlung für Sachsen-Anhalt sollten bevorzugt Herkünfte aus Flussgebietssystemen des Landes Sachsen-Anhalt (Elbe, Mulde, Saale und Havel) Verwendung finden, um auftretende Adaptionprobleme auszuschalten.</p> | |

Herkunftsgebiet der *Populus spp.* Pappel [900]
in Sachsen-Anhalt




Blatt 20

| Baumart: Vogelkirsche (<i>Prunus avium</i> L.) 814 | |
|--|---|
| Herkunftsgebiet | mögliche Austauschherkünfte |
| <i>Wuchsgebiet</i> | <i>mögliche DKV-Austauschherkünfte</i> |
| 81401 Norddeutsches Tiefland <i>13 Ostniedersächsisch-Altmärkisches Altmoränenland</i> | 81402 und DKV-Sonderherkunft "Ostharz" EZR-Nr.: 15 4 81404 001 2 |
| 81402 Mittel- und Ostdeutsches Tief- und Hügelland <i>11 Mittelbrandenburger Talsand- u. Moränenland</i> <i>15 Düben-Niederlausitzer Altmoränenland</i> <i>16 Hoher Fläming</i> <i>21 Nordwestliches Harzvorland</i> <i>22 Nordöstliche Harzvorländer</i> <i>23 Sachsen-Anhaltinische Löß-Ebene</i> <i>24 Leipziger Sandlöß-Ebene</i> <i>25 Sächsisch-Thüringisches Löß-Hügelland</i> <i>29 Inneres Thüringer Becken</i> <i>30 Nördliche Randplatten des Thüringer Becken</i> <i>31 Südliche Randplatten des Thüringer Becken</i> <i>41 Kyffhäuser</i> | DKV-Sonderherkunft "Ostharz" EZR-Nr.: 15 4 81404 001 2 „Qualifiziertes Vermehrungsgut“ Samenplantage "Gatersleben", Münden, Nds EZR-Nr.: 03 4 81404 002 3 „Qualifiziertes Vermehrungsgut“ Samenplantage "Knechtsteden", Oldendorf, Nds EZR-Nr.: 03 1 81404 001 3 |
| 81404 West- und Süddeutsches Bergland sowie Alpen und Alpenvorland <i>30 tlw. Nördliche Randplatten des Thüringer Becken</i> <i>40 Harz</i> | keine |

Herkunftsgebiete der *Prunus avium* L. Vogelkirsche [814]

in Sachsen-Anhalt




Blatt 21

| Baumart: | | Douglasie [<i>Pseudotsuga menziesii</i> (Mirb.) Franco] 853 |
|--|--|--|
| Herkunftsgebiet | Wuchsgebiet | mögliche Austauschherkünfte mögliche DKV-Austauschherkünfte |
| 85302 Nordostdeutsches Tiefland außer Schleswig-Holstein | 13 Ostniedersächsisch-Altmärkisches Altmoränenland | 85303 |
| 85303 Mittel- und Ostdeutsches Tief- und Hügelland | 11 Mittelbrandenburger Talsand- u. Moränenland 14 Mittleres Nordostdeutsches Altmoränenland 15 Düben-Niederlausitzer Altmoränenland 16 Hoher Fläming 21 Nordwestliches Harzvorland 22 Nordöstliche Harzvorländer 23 Sachsen-Anhaltinische Löß-Ebene 24 Leipziger Sandlöß-Ebene 25 Sächsisch-Thüringisches Löß-Hügelland 29 Inneres Thüringer Becken 30 Nördliche Randplatten des Thüringer Becken 31 Südliche Randplatten des Thüringer Becken 41 Kyffhäuser | 85302 aus ökologischer Grundeinheit 5 (= WG 13 sowie Göhrde, Wendland und Prignitz) |
| 85304 West- und Süddeutsches Hügel- und Bergland, kolline Stufe (bis 400m) | 30 tlw. Nördliche Randplatten des Thüringer Becken 40 Harz | keine |
| 85305 West- und Süddeutsches Hügel- und Bergland, montane Stufe (> 400m) | 40 Harz | keine |

Herkunftsgebiete der *Pseudotsuga menziesii* (Mirb.) Franco Douglasie [853]


in Sachsen-Anhalt



Blatt 22

| Baumart: | | Traubeneiche [<i>Quercus petraea</i> (Mattuschka) Liebl.] 818 | |
|---|--|--|--|
| Herkunftsgebiet | | mögliche Austauschherkünfte | |
| Wuchsgebiet | | mögliche DKV-Austauschherkünfte | |
| 81803 Heide und Altmark | 13 <i>Ostniedersächsisch-Altmärkisches Altmoränenland</i> | 81804 und 81805 | |
| 81804 Ostdeutsches Tiefland | 11 <i>Mittelbrandenburger Talsand- u. Moränenland</i> 14 <i>Mittleres Nordostdeutsches Altmoränenland</i> 15 <i>Düben-Niederlausitzer Altmoränenland</i> 16 <i>Hoher Fläming</i> | 81803 aus ökologischer Grundeinheit 5 (= WG 13 sowie Göhrde, Wendland und Prignitz) aus 81805 <u>nur</u> DKV-Sonderherkunft "Ziegelrodaer Plateau" EZR-Nr.: 15 5 81805 093 2 und 15 5 81805 096 3 | |
| 81805 Mitteldeutsches Tief- und Hügelland | 21 <i>Nordwestliches Harzvorland</i> 22 <i>Nordöstliche Harzvorländer</i> 23 <i>Sachsen-Anhaltinische Löß-Ebene</i> 24 <i>Leipziger Sandlöß-Ebene</i> 25 <i>Sächsisch-Thüringisches Löß-Hügelland</i> 29 <i>Inneres Thüringer Becken</i> 30 <i>Nördliche Randplatten des Thüringer Becken</i> 31 <i>Südliche Randplatten des Thüringer Becken</i> 41 <i>Kyffhäuser</i> | 81804 81807 aus ökologischer Grundeinheit 8 (= WG 40 sowie Westharz) | |
| 81807 Harz, Weser- und Hessisches Bergland außer Spessart | 30 <i>tlw. Nördliche Randplatten des Thüringer Becken</i> 40 <i>Harz (nur für WB 4004, 4005, 4006 und 4007)</i> | 81805 | |


**Herkunftsgebiete der *Quercus petraea* (Mattuschka) Liebl.
Traubeneiche [818]
in Sachsen-Anhalt**



Blatt 23

| Baumart: Stieleiche (<i>Quercus robur</i> L.) 817 | |
|---|--|
| Herkunftsgebiet <i>Wuchsgebiet</i> | mögliche Austauschherkünfte <i>mögliche DKV-Austauschherkünfte</i> |
| 81703 Heide und Altmark <i>13 Ostniedersächsisch-Altmärkisches Altmoränenland</i> | 81704 und 81705 |
| 81704 Ostdeutsches Tiefland <i>11 Mittelbrandenburger Talsand- u. Moränenland</i> <i>14 Mittleres Nordostdeutsches Altmoränenland</i> <i>15 Düben-Niederlausitzer Altmoränenland</i> <i>16 Hoher Fläming</i> | 81703 aus ökologischer Grundeinheit 5 (= WG 13 sowie Göhrde, Wendland und Prignitz) 81705 (insbesondere DKV-Sonderherkünfte "Ziegelrodaer Plateau" und "Saale-Unstrut" EZR-Nr.:15 4 81705 025 2 und 15 4 81705 010 2) |
| 81705 Mitteldeutsches Tief- und Hügelland <i>21 Nordwestliches Harzvorland</i> <i>22 Nordöstliche Harzvorländer</i> <i>23 Sachsen-Anhaltinische Löß-Ebene</i> <i>24 Leipziger Sandlöß-Ebene</i> <i>25 Sächsisch-Thüringisches Löß-Hügelland</i> <i>29 Inneres Thüringer Becken</i> <i>30 Nördliche Randplatten des Thüringer Becken</i> <i>31 Südliche Randplatten des Thüringer Becken</i> <i>41 Kyffhäuser</i> | 81706 aus ökologischer Grundeinheit 8 (= WG 40 sowie Westharz) 81704 |
| 81706 Westdeutsches Bergland <i>30 tlw. Nördliche Randplatten des Thüringer Becken</i> <i>40 Harz (nur für WB 4004, 4005, 4006 und 4007)</i> | 81705 |


Herkunftsgebiete der *Quercus robur* L. Stieleiche [817] in Sachsen-Anhalt



Blatt 24

| Baumart: | | Roteiche (<i>Quercus rubra</i> L.) 816 |
|------------------------------|---|--|
| Herkunftsgebiet | Wuchsgebiet | mögliche Austauschherkünfte mögliche DKV-Austauschherkünfte |
| 81601 Norddeutsches Tiefland | 13 Ostniedersächsisch-Altmärkisches Altmoränenland | keine |
| 81602 Übriges Bundesgebiet | 11 Mittelbrandenburger Talsand- u. Moränenland 14 Mittleres Nordostdeutsches Altmoränenland 15 Düben-Niederlausitzer Altmoränenland 16 Hoher Fläming 21 Nordwestliches Harzvorland 22 Nordöstliche Harzvorländer 23 Sachsen-Anhaltinische Löß-Ebene 24 Leipziger Sandlöß-Ebene 25 Sächsisch-Thüringisches Löß-Hügelland 29 Inneres Thüringer Becken 30 Nördliche Randplatten des Thüringer Becken 31 Südliche Randplatten des Thüringer Becken 40 Harz 41 Kyffhäuser | keine |


Herkunftsgebiete der *Quercus rubra* L. Roteiche [816] in Sachsen-Anhalt



Blatt 25

| Baumart: | | Robinie (<i>Robinia pseudoacacia</i> L.) 819 |
|------------------------------|---|--|
| Herkunftsgebiet | Wuchsgebiet | mögliche Austauschherkünfte mögliche DKV-Austauschherkünfte |
| 81901 Norddeutsches Tiefland | 13 Ostniedersächsisch-Altmarkisches Altmoränenland | 81902 <u>nur</u> „Qualifiziertes Vermehrungsgut“ Samenplantage „Göritz“ EZR-Nr.: 15 3 81902 001 3 |
| 81902 Übriges Bundesgebiet | 11 Mittelbrandenburger Talsand- u. Moränenland 14 Mittleres Nordostdeutsches Altmoränenland 15 Düben-Niederlausitzer Altmoränenland 16 Hoher Fläming 21 Nordwestliches Harzvorland 22 Nordöstliche Harzvorländer 23 Sachsen-Anhaltinische Löß-Ebene 24 Leipziger Sandlöß-Ebene 25 Sächsisch-Thüringisches Löß-Hügelland 29 Inneres Thüringer Becken 30 Nördliche Randplatten des Thüringer Becken 31 Südliche Randplatten des Thüringer Becken 40 Harz 41 Kyffhäuser | keine |


Herkunftsgebiete der *Robinia pseudoacacia* L. Robinie [819] in Sachsen-Anhalt



Blatt 26

| Baumart: Winterlinde (<i>Tilia cordata</i> Mill.) 823 | |
|---|--|
| Herkunftsgebiet | mögliche Austauschherkünfte |
| <i>Wuchsgebiet</i> | <i>mögliche DKV-Austauschherkünfte</i> |
| 82302 Nordostdeutsches Tiefland <i>13 Ostniedersächsisch-Altmärkisches Altmoränenland</i> | 82303 |
| 82303 Mittel- und Ostdeutsches Tief- und Hügelland <i>11 Mittelbrandenburger Talsand- u. Moränenland</i> <i>14 Mittleres Nordostdeutsches Altmoränenland</i> <i>15 Düben-Niederlausitzer Altmoränenland</i> <i>16 Hoher Fläming</i> <i>21 Nordwestliches Harzvorland</i> <i>22 Nordöstliche Harzvorländer</i> <i>23 Sachsen-Anhaltinische Löß-Ebene</i> <i>24 Leipziger Sandlöß-Ebene</i> <i>25 Sächsisch-Thüringisches Löß-Hügelland</i> <i>29 Inneres Thüringer Becken</i> <i>30 Nördliche Randplatten des Thüringer Becken</i> <i>31 Südliche Randplatten des Thüringer Becken</i> <i>41 Kyffhäuser</i> | 82302 aus ökologischer Grundeinheit 5 (= WG 13 sowie Göhrde, Wendland und Prignitz) |
| 82304 Westdeutsches Bergland <i>30 tlw. Nördliche Randplatten des Thüringer Becken</i> <i>40 Harz</i> | keine |

Herkunftsgebiete der *Tilia cordata* Mill. Winterlinde [823] in Sachsen-Anhalt



Blatt 27

| Baumart: Sommerlinde (<i>Tilia platyphyllos</i> Scop.) 824 | |
|---|---|
| Herkunftsgebiet <i>Wuchsgebiet</i> | mögliche Austauschherkünfte <i>mögliche DKV-Austauschherkünfte</i> |
| 82401 Norddeutsches Tiefland <i>13 Ostniedersächsisch-Altmarkisches Altmoränenland</i> | 82402 |
| 82402 Mittel- und Ostdeutsches Tief- und Hügelland <i>11 Mittelbrandenburger Talsand- u. Moränenland</i> <i>14 Mittleres Nordostdeutsches Altmoränenland</i> <i>15 Düben-Niederlausitzer Altmoränenland</i> <i>16 Hoher Fläming</i> <i>21 Nordwestliches Harzvorland</i> <i>22 Nordöstliche Harzvorländer</i> <i>23 Sachsen-Anhaltinische Löß-Ebene</i> <i>24 Leipziger Sandlöß-Ebene</i> <i>25 Sächsisch-Thüringisches Löß-Hügelland</i> <i>29 Inneres Thüringer Becken</i> <i>30 Nördliche Randplatten des Thüringer Becken</i> <i>31 Südliche Randplatten des Thüringer Becken</i> <i>41 Kyffhäuser</i> | 82401 |
| 82404 West- und Süddeutsches Bergland sowie Alpen und Alpenvorland <i>30 tlw. Nördliche Randplatten des Thüringer Becken</i> <i>40 Harz</i> | keine |

Herkunftsgebiete der *Tilia platyphyllos* Scop. Sommerlinde [824] in Sachsen-Anhalt

